دکتر شریعتي –

1- آقاي 57 ساله با سابقه دیابت 10 ساله مبتلا به ضایعه طاولي در ناحیه تناسلي گردیده است مشابه این ضایعه را در سابقه خود ذکر مي کند که نمي داند به چه علت بوده است سابقه مصرف کدامیک از داروهاي زیر براي تشخیص اهمیت دارد

الف- سولفامید ب- اسپیرین ج- گلي بن کلامید

د- انسولین

2- دحتر خانم 18 ساله با ضایعات ثابت داروئي درتنه مراجعه کرده است حساسیت نامبرده از کدام گروه واکنشي هاي آلرژیک مي باشد

الف- Type I ب- Type II ج- Type III د- Type IV

3- کدامیک از عوامل زیر در بروزبیماري S.L.E دخیل مي باشد ؟

الف- ارث ب- عوامل محیطي ج- اشعه UVA,B

د- همه موارد فوق

4- شایعترین محلي گرفتاري احشا داخلي در بیماري اسکرودرمي سیتمیک ؟

الف- کلیه ها ب- مري ج- معده د- ریه

5- کدامیک از علائم مشترک دربیماریهاي کلاژن مي باشد ؟

الف- پاپولهاي گوترون ب- هلیوتروپ اریتما

ج- کلسینوزیس کوتیس د- خارش پوست

1

خانم دکتر فقیهي –

1- شایعترین نوع اگزماي دست کدام است ؟

الف- آلرژیک کنتاکت درماتیت ب- ایریتانت کنتاکت درماتیت

ج- آتوپیک درماتیت د- دیسکوئید درماتیت

2- کدامیک از موارد زیر بعنوان آلرژن شایع در آلرژیک کنتاکت درماتیت مطرح مي گردد؟

الف- بالزام پرو ب- اپوکسي رزین

ج- نیکل د- پیچک

3- کدامیک از اگزماهاي زیر آندوژن نمی باشد ؟

الف- اگزماي دیسکوئید ب- اگزماي آتوپیک

ج- اگزماي پالمارهیپرکراتوتیک د- ایریتانت کنتاکت درماتیت

ص

4- در اگزماي آتوپیک شیر خوار9 ماهه کدام عبارت صحیح مي باشد ؟

الف- خارش جزوعلائم نادر است

ب- تابلوي بالیني پلاکها ، به شکل پسوریازیسي با هیپرکراتوزسطحي وبیشتردر فلکسورهادیده مي شود

ج- عفونتهاي تنفسي در تشدید اگزماي وي نقش دارند

د- درمان طولاني با استروئید موضعي براي بهبود کامل ضایعات توصیه مي گردد.

5- کدامیک از مکانیزم هاي پاتوژنزمي تواند در درماتیت آتوپیک مطرح گردد.

الف- فعالیت سلولهاي کراتینوسیت وملانوسیتها وافزایش M SHدر پوست

ب- فعالیتهاي نوتروفیلهاورهایي پروتئازهادر پوست

ج- فعالیت سلولهاي لانگرهانس وافزایش رهایي اینترلوکین 4 از سلولهاي T

د- فعالیت سلولهاي ماکروفاژي و افزایش ترشح KDGF از کراتینوسیتها

1دکتر سیادت

1- کدام یک ار داروهاي موضعي زیر به عنوان درمان انتخابي کومدون ها شناخته مي شود .

الف- آزلائیک اسید ب- اریترومایسین

ج- ترتینوئین د- سولفور

2- جذب داروهاي موضعي در کدام منطقه زیر حداکثر است ؟

الف- پوست تنه ب- اسکروتوم

ج- مخاط د- کف دست وپا

خانم ایرجي

1- زني 30 ساله با پلاکهاي سفید مشبک در مخاط بوکال به درمانگاه مراجعه کرده است پاپولهاي خارش دار در مچ دست وساعد بیمار دیده مي شود کدام ضایعه ناخني در این بیماري شایعتر دیده مي شود ؟

الف- اونیکولیز صفحه ناخن ب- pitting

ج- نازکي صفحه ناخن د- ناخنک

2- مردي 40 ساله با برجستگي سفت پوستي با قطر بیش از 12cm به درمانگاه مراجعه کرده است از نظر سمیولوژي کدام ضایعه براي بیمار مطرح است

الف- Macule ب- papule

ج- patch د- plaque

3- غده آپوکرین در کدام قسمت بدن دیده مي شود

الف- کف دست وپا ب- پلکها

ج- chest د- back

4- کدام سلول بطور طبیعي در اپیدرم <u>یافت نمي شود ؟</u>

الف- ملانوسیت ب- لانگرهانس سل

ج- مرکل سل د- ماست سل

5- مردي 32 ساله با یک patch بیضوي به قطر 2cm در روي تنه و باماکولها ي صورتي رنگ با پوسته هاي سفید رنگ در اطراف ضایعه بدون خارش به درمانگاه مراجعه کرده است کدام اقدام درماني براي وي تجویز مي شود .

الف- متوترکسات ب- اترتینیت

ج- PUVAتراپي سیستمیک د- UVB

دکتر اصیلیان

1ـ معیار ABCD در ملانوما صحیح است بجز :

الف = A عدم قرینگي

ب ـ B = سطح ناهموار

ج ـ C = تغییرات رنگ

د ـ D = قطر بیش از 6 میلي لیتر

2ـ کدامیك از ملانومهاي زیر از ابتدا حالت تهاجمي دارد ؟

الف ـ نوع سطحي

ب ـ لنتیگو مالیگنا

ج ـ نوع ندولر

د ـ نوع لنتیگو مالیگنا ملانوما

3ـ موارد زير در وتيليگوي درماتومال صحيح است بجز :
الف ـ در سنين جواني ديده مي شود .
ب ـ تا يك سال رشد مي كند.
ج ـ با خال هاله دار همراه است.
د ـ پديده كوبنر در آن منفي است

4- به تومري اطلاق مي شود كه تمام ضخامت اپيدرم دچار ديسپلازي شده است ولي به عمق تهاجم ندارد. ضايعات ان به صورت ماكولها و پلاكهاي اريتماتوست كه به تدريج بزرگ مي شوند . اغلب بر روي ضايعات پوسته و دلمه وجود دارد با پسوريازيس و اگزما و حتي عفونتهاي قارچي اشتباه مي شود . محتملترين تشخيص شما كدام است؟
الف ـ بيماري بوون ب ـ كارسينوم سلول سنگفرشي
ج ـ بيماري پاژه پستان د ـ وروكوز كارسينوما

5- بيماري با كهير حاد مراجعه كرده است و براي او هيدركسي زين با دوز 75 ميلي گرم شروع شده ولي پاسخ نداده است به نظر شما كدام روش پيشنهادي زير منطقي تر است؟
الف ـ اضافه نمودن H2 بلوكر
ب ـ اضافه كردن H1 بلوكر غير سداتيو
ج ـ اضافه كردن آرامبخشها
د - افزايش دوز هيدروكسي زين به 200 ميلي در روز

خانم دكتر انشائيه

1- مصرف همزمان گريزئوفلوين با كداميك از داروهاي زير نياز به دقت زياد دارد
الف- وارفارين ب- استروئيد
ج- آنتي بيوتيك ها د- آنتي هيستامين ها
2- كداميك از داروهاي موضعي زير بر قارچ ناخن موثر است ؟
الف- گريزئوفولوين ب- سيكوپيروكسولامين
ج- نيستاتين د- كلوتريمازول
3-كداميك از موازد زير در دوران بارداري ميتواند عوارض جنيني داشته باشد
الف- زونا ب- تبخال نوع 1
ج- تبخال نوع 2 د- اورف
4- كداميك از موارد زير باعث تشخيص آبله مرغان از ايمپتيگو مي شود
الف- ضايعه مخاطي ب- شكل قطره اي وزيكول
ج- وزيكول نافي شكل د- دلمه
5- در تشخيص افتراقي كريون كداميك ازموارد زير بيشتر مطرح ميشود ؟
الف- ايمپتيگو ب- لوپوس اريتماتو
ج- ليكن پلان د- آلوپسي آرآتا

دکتر سعیدیان

1- شایعترین میکروارگانیسم عامل پا رونیشي حاد کدام است ؟
الف- پسودوموناب- استرپتوکوک
ج- کاندیدا د- استاف اورئوس

2- شایعترین علت pitting ناخن کدام مورد زیر است ؟
الف- لیکن پلان ب- پسوریازیس
ج- تروما د- درماتوفیت
3- جدا شدن Nail plat از بستر ناخن را چه مي گویند ؟
الف- proximal onycholysise
ب- pitting
ج- sub ungual Hyper Keratosis
د- Nail thickening

دکتر شاهمرادي

1 -جذب کدامیک از داروهاي ذیل در مصرف همزمان با غذا بیش از همه کاهش مي یابد ؟
الف- کپسول اکوتان ب- کپسول تتراسیکین
ج- کپسول داکسي سیکلین د- قرص کوتري موکسازول
2- شایعترین علت شکست درماني در آکنه کدام مورد است ؟
الف- مقاومت به آنتي بیوتیک ب- فولیکولیت هاي گرام منفي
ج- عدم آموزش بیماران د- عدم توانایي مالي بیماران
3- کدامیک از جملات زیر در مورد بیماري TENنادرست است ؟
الف- شایعترین علت آن داروها هستند
ب- محل تاولها در لایه گرانولر است
ج- بیشتر در بالغین اتفاق مي افتد
د- درمان آن I.V.I.g است
4- مردي 23 ساله با تاولهاي متعدد در اگزیلا وکشاله ران که در تابستانها تشدید مي شود مراجعه کرده است .
D IF ضایعات منفي است کدام جمله در مورد بیمارنادرست است ؟
الف- بیماري ارثي است
ب- درمان انتخابي آن کورتن سیستمیک است
ج- گرفتاري مخاطي نادر است
د- آنتي بیوتیک دردرمان آن موثر است
5- بیماري با ضایعات تاولي در سروصورت وتنه مراجعه کرده است بیوپسي محل تاولها را درلایه گرانولر نشان مي دهد ANAاز بیمار چک شده که مثبت بوده است . تشخیص شما چیست ؟
الف- پمفیگوس اریتماتو ب= اپیدرمولیز بولوزا
ج- پمفیگوئید د- پمفیگوس خوشخیم فامیلیال
6- در مورد لیشمانیوز جلدي منتشر(D.C.L) کدام جمله صحیح است ؟
الف- تست لیشمنین مثبت است
ب- ندولهاي متعدددر پوست ومخاط دیده مي شود
ج- عود بدنبال درمان شایع است
د- گرفتاري احشایي در 20% موارد دیده مي شود
7- درمورد گال نروژي (دلمه دار) کدام جمله نادرست است ؟
الف- در ایدز شایعتر است ب- منجر به اریترودرمي شود .
ج- ایورمکتین در درمان آن موثر است د_خارش شدید دارند.

خانم دکترفاطمي

1- پسر بچه 6 ساله اي با ادم صورت واندام ها بدون هيچ شكايتي مراجعه نموده است در شرح حال بيمار فقط سابقه ايكتيما در چند هفته پيش وجود دارد اولين اقدام شما چيست ؟
الف- بيمار را به متخصص داخلي ارجاع مي دهيم
ب- آزمايش كامل ادرار ارسال مي كنيم
ج- براي بيمار سفالكسين خوراكي شروع مي كنيم
د- براي بيمار آنتي هيستامين خوراكي شروع مي كنيم
2- مردي 27 ساله مبتلا به ALL با پلاكي اريتماتو، تندر ومتورم در ساق پاي راست ، از 2 روز پيش ، مراجعه نموده در معاينه ضايعه گرمتر از پوست اطراف است وروي آن بولي بزرگي مشهود مي باشد چه اقدامي انجام مي دهيد ؟
الف- از ضايعه بيوپسي كرده وبراي بيمار كلوگزا سيلين وريدي شروع مي كنيم
ب- بيمار را بستري وبراي وي نفسيلين وريدي شروع مي كنيم
ج- از ضايعه بيوپسي كرده و براي بيمار آنتي بيوتيكهاي وسيع الطيف شروع مي كنيم
د- از ترشحات ضايعه تاولي لام مستقيم وكشت ارسال وبراي بيمار آنتي بيوتيك وسيع الطيف شروع مي كنيم
3- قطعي ترين راه تشخيص لوپوس ولگاريس كدامست ؟
الف- بيوپسي پوست وديدن گرانولوم كازيفيه
ب- بيوپسي پوست وديدن باسيل اسيد فاست در گرانولوم
ج- بيوپسي پوست وانجام PCR
د- بيوپسي پوست وارسال آن براي كشت
4- خانمي 37 ساله در مهر ماه با ضايعات پاپولر وبولوز خارش دار درساعد هر دو دست مراجعه نموده است ومتذكراست ضايعات درتابستان شروع شده و سال گذشته نيز در بهار چنين ضايعاتي داشته كه در زمستان كاملا بهبود يافته و هيچ اسكاري يا پيگمانتاسيوني بر جاي نگذاشته است اولين تشخيص شما چيست ؟
الف- ليكن پلان ب- PLE
ج- اريتم مولتي فرم د- پلاگر
5- كدامیک جزو علل ايجاد پسودوپورفيري نمي باشد ؟
الف- نارسايي مزمن كليه ب- لوپوس اريتماتو
ج- تماس طولاني مدت با آفتاب در افراد با پوست روشن
د- مصرف پروپرانولول بمدت طولاني

دكتر نيلفروش زاده

1-- كدامیک در مورد درماتيت Berloque صحيح نمی باشد ؟
الف- فقط در افراد آلرژيک به عصاره برگاموت ايجاد ميشود
ب-در اولين تماس با عصاره برگاموت ممكن است ايجاد گردد
ج- محدودبه ناحيه تماس با عصاره برگاموت ايجاد مي شود
د- ضايعه پوستي به شكل اريتم وپوسته ريزي مي باشد

2-کدامیک از لایه هاي پوست در توپیکال تراپي وجذب از لایه هاي پوستي نقش بیشتري دارند ؟

الف- لایه شاخي ب- لایه گرانوله

ج- لایه بازال د- درم